



Educando  
para a paz



## Gabarito

### Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Neonatal Nutrição

- 1 - I, II e III, apenas.
- 2 - I e II, apenas.
- 3 - As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- 4 -II e III.
- 5 - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- 6 - I, II e IV, apenas.
- 7 - II e III, apenas.
- 8 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- 9 - I e II, apenas.
- 10 - I, II e III.
- 11- A ação do grupo 3 é prevenção secundária.
- 12 - universalidade foi aplicado, já que teve acesso a medicação e tratamento.
- 13 - Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde.
- 14 - O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de saúde.
- 15 - I, III e V somente.
- 16 - hierarquização.
- 17- Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho.

18- Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da equipe e monitoramento constante.

19-I e IV somente.

20 - no mínimo 15% da arrecadação dos impostos.

21 - 0,7 litros/dia.

22 - Oferecer leite com baixo teor de gorduras (semi-desnatado), sob supervisão médica/nutricional, com objetivo de evitar deficiências nutricionais e déficit de crescimento, bem como nenhum tipo de açúcar até 2 (dois) ano de idade.

23 - Entre RDA e UL.

24 - Prolactina e ocitocina.

25 - Fenômeno de Raynaud.

26 - Garantir ao RN em todas as Unidades Neonatais brasileiras (públicas e privadas) o livre acesso de sua mãe e de seu pai, e a permanência de um desses a seu lado, durante todo o tempo de internação, esteja ele em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal convencional ou Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru.

27 - Materna, fetal e latrogênica.

28 - As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta para a primeira.

29 - Protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e na Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.

30 - Para uma mulher de 68 anos de idade, recomenda-se a ingestão média de folato de 46 g/dia de proteína.

31 - Resolução nº 600 de 2018.

32 - O nutricionista tem o compromisso de conhecer e pautar sua atuação nos princípios universais dos direitos humanos e da bioética, na Constituição Federal e nos preceitos éticos contidos neste Código.

33 - Perímetro cefálico.

34 - 145mg/dL.

35 - 70-120mg/dL.

36 - Inicia-se primeiramente com leite materno humano cru ou pasteurizado e na impossibilidade de utilizar leite materno, a opção mais apropriada é o emprego de fórmulas infantis específicas para o pré-termo.

37 -Hepatobiliares (colestase) e sepse.

38 -Triacilgliceróis.

39 -Cisteína.

40 - 72.

41 -3:1 (dextrose, lipídios e proteínas no mesmo recipiente).

42 -Receber NP nas primeiras horas de vida e sugere-se, inicialmente, solução contendo aminoácidos, glicose e eletrólitos.

43 -Óleo de canola e óleo de soja.

44 -Ácidos graxos essenciais são os ácidos graxos poli-insaturados que apresentam duplas ligações cis e pertencem às famílias ômega 6 como o ácido linoleico (18:2) ou ômega 3 como o ácido linolênico (18:3). Não podem ser produzidos por seres humanos, sendo ingeridos através da dieta.

45 -Sacarose e mel.

46 -(I) Lactogênese, (II) Galactorréia, (III) Mamogênese, (IV) Galactopoiése.

47 -Aquele que é mais fisiológica e na qual se incorpora maior quantidade de nutrientes relacionados ao peso, idade gestacional, condições gerais, exames laboratoriais e idade pós-natal do bebê.

48 -Vitamina A.

49 -O tratamento deve começar o mais cedo possível no início da vida e consiste na remoção de todas as fontes de lactose e galactose da dieta de lactentes sem nenhuma atividade da enzima galactose-1- fosfato -uridil transferase. Lactentes que apresentam 5 a 10% de atividade normal da galactose-1-fosfato-uridil transferase podem tolerar pequenas quantidades de galactose.

50-Leite materno humano.