



Educando
para a paz



Gabarito

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Intensiva Farmácia

- 1 - I, II e III, apenas.
- 2 - I e II, apenas.
- 3 - As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- 4 - II e III.
- 5 - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- 6 - I, II e IV, apenas.
- 7 - II e III, apenas.
- 8 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- 9 - I e II, apenas.
- 10 - I, II e III.
- 11 - A ação do grupo 3 é prevenção secundária.
- 12 - universalidade foi aplicado, já que teve acesso a medicação e tratamento.
- 13 - Criação de Conselho de Saúde e Fundo de Saúde.
- 14 - O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira que mobilizou a sociedade em torno de novas políticas e novos modelos de organização do sistema, serviços e práticas de saúde.
- 15 - I, III e V somente.
- 16 – hierarquização.
- 17 - Analisar o processo, ambiente e condições de trabalho.
- 18 - Na Atenção Primária, trabalhar com o planejamento estratégico Situacional é o desejável, pois este identifica soluções viáveis para a realidade local, com participação da equipe e monitoramento constante.
- 19 - I e IV somente.
- 20 - no mínimo 15% da arrecadação dos impostos.

- 21 - O processo de avaliação farmacêutica da prescrição da NP quanto à sua adequação, concentração e compatibilidade físico-química de seus componentes e dosagem de administração deve ser realizada pelo farmacêutico antes do início da manipulação.
- 22 - A dissolução insuficiente do fármaco é um fator intrínseco, também chamado de interno, que proporciona o impedimento da administração do medicamento.
- 23 - Os itens representados pela ABC indica uma classificação de informações, para que se separem os itens de menor importância ou impacto, para se estabelecer formas de gestão apropriada à importância de cada medicamento em relação ao valor total dos estoques.
- 24 - peróxido de hidrogênio e sonda nasoenteral.
- 25 - locais protegidos da luz, como a embalagem original, caixas fechadas ou papel alumínio.
- 26 - A maioria das suspensões deve ser acondicionada em recipientes hermeticamente fechados e protegidos do calor excessivo e da luz.
- 27 - O medicamento mais vantajoso será aquele que apresentar a menor razão de custo-efetividade.
- 28 - Uma solução injetável, estéril e apirogênica, de grande ou pequeno volume, própria para administração por via parenteral.
- 29 - Serviço de Psicologia.
- 30 - Definir, mesmo que sem a cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição, de acordo com a autonomia estipulada pelo Hospital e seus administradores.
- 31- Em temperatura ambiente - temperatura entre 15 e 45 °C.
- 32 - Portaria nº 4283/2010.
- 33 - Está correta apenas a assertiva I.
- 34 – Dexmedetomidina.
- 35 - Lidocaína, Fentanil, Midazolam, Succinilcolina.
- 36 – Eritropoetina.
- 37 - Esse regulamento confere ao farmacêutico a competência para realizar todas as operações inerentes ao desenvolvimento, preparação, avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte da NP.
- 38 - Estão corretas: 1, 2, e 3.
- 39 - I e III estão certas.
- 40 - Estão corretas: I, III e V.
- 41 - Somente as sentenças I, II, III, IV são verdadeiras.
- 42 - em geral os desfechos clínicos para os estudos de minimização de custos derivam de estudos clínicos (preferencialmente controlados, randomizados e duplo-cegos), estudos de coorte ou estudos observacionais.

43 - Estão corretas: I, III e V.

44 - Nenhuma das alternativas.

45 - Estão corretas as assertivas II e III.

46 - Fosfodiesterase-5; PDE-5; vasodilatação, hipotensão.

47 - Antígeno A, Antígeno B e nenhum Anticorpo.

48 - Os comprimidos de ação imediata podem ser administrados por sondas enterais uma vez que a manipulação por trituração não repercute em perda da resposta terapêutica, mas podem obstruir o lúmen de sondas de fino calibre. Uma sugestão farmacêutica pode ser a substituição por uma suspensão ou solução com o mesmo princípio ativo.

49 - 50 mg e 350 mg.

50 - O antimicrobiano Meropenem está indicado para as infecções causadas por bactéria *Escherichia coli* somente.